



FOLIAREL® Ca

15% CaO

SECONDARY ELEMENTS BASED FERTILISER COMPLEXED CALCIUM (Ca LIGNOSULPHONATE)		
Composition	Total Calcium (Ca)	10,7 %
	Corresponding to total water soluble Calcium Oxide (CaO)	15 %
	Complexed Calcium (Ca)	8,6 %
	Corresponding to complexed Calcium Oxide (CaO)	12 %
Complexing agent: NH ₂ -lignosulphonate		
Formulation	Liquid (Specific weight: 1,47 kg/dm ³ at 20°C)	
Net Weight	1,47 kg (1l at 20°C)	

Crops	Doses		Application time & mode
	ml/hi	l/ha	
Cherry, Peach, Nectarine, and Plum trees	200-250	2-2,5	3 treatments every 15 th day after fruit-setting until fruit color development
Pear, Apple	200-250	2-2,5	Every 11 th -16 th day, from the first natural fruit falling onwards
Grapevine (Chardonnay & other types sensitive to bunch rots)	200-250	2-2,5	Every 11 th -16 th day, from bunch closing onwards
Horticultural crops: - fruit bearing ones - leafy ones	200-250	2-2,5	Every 13 th -16 th day, since first fruit setting onwards
	200-250	2-2,5	Every 11 th -13 th day, since head formation onwards
Flower crops	200-250		Every 13 th -16 th day
Tobacco, float system transplant seedling production	200		After each clipping
Fertirrigation		15-20	

Caution

The product may naturally be affected by sedimentation, it is therefore advisable to shake before usage. Maintain the suggested concentration independently of the spray volume applied per hectare. On Liliun do not apply concentrations greater than 200 ml/100 l.

1 Litre 1,47 kg Net



COMPANY WITH INTEGRATED
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001/2000
ISO 14001



FOLIAREL® Ca

15% CaO

CONCIME A BASE DI ELEMENTI SECONDARI COMPLESSO DI CALCIO (Ca LIGNINSOLFONATO)		
Composizione	Calcio (Ca) Totale	10,7 %
	Corrispondente a Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua	15 %
	Calcio (Ca) in forma di complesso	8,6 %
	Corrispondente a Ossido di Calcio (CaO) in forma di complesso	12 %
Agente complessante: Ligninsolfonato di Ammonio		
Formulazione	Liquido (Peso specifico: 1,47 kg/dm ³ a 20°C)	
Confezione	1,47 kg (1l a 20°C)	

Colture	Dosi		Epoca e modalità di applicazione
	ml/hi	l/ha	
Ciliegio, Pesco, Nettarina e Susino	200-250	2-2,5	3 trattamenti ogni 15 giorni subito dopo l'allegagione fino all'invaiatura
Pero, Melo	200-250	2-2,5	Ogni 10-15 giorni dalla prima cascola naturale in poi
Vite (Chardonnay e altri altri vitigni sensibili al marciume del grappolo)	200-250	2-2,5	Ogni 10-15 giorni da chiusura del grappolo in poi
Colture ortive: - da frutto - da foglia	200-250	2-2,5	Ogni 12-15 giorni dall'allegagione del primo palco
	200-250	2-2,5	Ogni 10-15 giorni da 4 foglie vere
Colture da Fiore	200-250		Ogni 12-15 giorni
Tabacco (produzione di piantine con il float system)	200		Dopo ogni taglio
Fertirrigazione		15-20	

Avvertenze

Il prodotto può essere naturalmente soggetto a sedimentazione, se ne consiglia pertanto l'agitazione prima dell'uso. Mantenere le concentrazioni suggerite, indipendentemente dal volume applicato per ettaro. Su Liliun non applicare concentrazioni superiori a 200 ml/100 l.

FertiGlobal®



Prodotto e confezionato dal / Manufactured and packed by:

Società Chimica Larderello s.p.a.

20124 Milano - Italy - Via Fara, 28
Tel +39 02 6771681 - Fax +39 02 67716820
www.fertiglobal.com